

# Folpec 40 SC

Fungicida antiperonosporico ad azione preventiva in sospensione concentrata

Composizione: Folpet 40% (=480 gr/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)



Classificazione DPD: NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Classificazione CLP:

Registrazione: n° 13714 del 9/11/2007

Packaging: tanica 10 L - pallet 500 L



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fungicida multisito ad azione preventiva dotato di tre diversi meccanismi di azione sul fungo: inibizione della respirazione, azione sulla divisione cellulare e interferenze con la permeabilità delle membrane
- Attività polivalente su Peronospora, Escoriosi e Botrite. Presenta inoltre attività collaterale su Oidio e Marciume nero.
- Formulazione in sospensione concentrata dotata di una elevatissima miscibilità e stabilità.

## VANTAGGI

- Partner ideale di fungicidi sistemici o citotropico-translaminari in virtù sia capacità di proteggere la vegetazione esistente al momento del trattamento.
- Molto indicato all'interno di strategie antiresistenza in virtù dell'azione multisito.
- Inserito dal 2015 nella maggior parte dei disciplinari di produzione integrata della vite.
- Superiore attività di contatto rispetto a fungicidi con azione simile (Mancozeb, Rame).
- Ottima protezione del grappolo da Peronospora e Botrite.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

(In via di estensione su Pomodoro)

COLTURA	AVVERSITA'	DOSI E MODALITA' APPLICATIVE
Vite (uva da vino)	Peronospora, Botrite, Escoriosi. Attività collaterale su Oidio e Black rot.	Interventi preventivi a partire dalla fase di post-germogliamento in poi alla dose di 200-250 g/hl. In presenza di forte sviluppo della vegetazione il prodotto si abbina perfettamente con fungicidi sistemici o citotropico-translaminari al fine di ottenere una protezione totale della vegetazione e del grappolo.

**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta sulle uve da vino.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Non impiegare su uve da Tavola Peronospora della Vite
- Miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione della Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Oli Bianchi.
- Attendere almeno 20 giorni da eventuali applicazioni con olii minerali prima di eseguire il trattamento.
- Impiegare volumi di acqua tali da garantire una opportuna copertura delle foglie e dei grappoli in particolare in presenza di vegetazione molto sviluppata.

La consultazione della scheda non sostituisce una attenta lettura dell'etichetta del prodotto.



Peronospora della Vite



Muffa grigia della Vite