

# Kubik McZ

Fungicida sistemico per la lotta contro la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco

Composizione: Metalaxil 8% - Mancozeb 64%  
Formulazione: Polvere bagnabile (WP)



Classificazione DPD: NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Classificazione CLP:

Packaging: sacco 1 kg - cartone 12x1 kg - pallet 400 kg  
sacco 10 kg - pallet 500 kg



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta alle Peronospacee delle colture Vite, Tabacco e Pomodoro
- Elevata sistemica combinata all'azione di copertura del Mancozeb, particolarmente indicato per i trattamenti nelle fasi iniziali
- Elevata capacità protettiva nei confronti dei grappoli in via di fioritura e allegagione.

## VANTAGGI

- Massima protezione della vegetazione esistente e di quella in via di formazione
- Particolarmente indicato nei trattamenti di pre e post fioritura
- Miscela indicata in strategia antiresistenza in virtù della sua attività multisito.



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO


COLTURA	AVVERSITA'	DOSI E MODALITA' APPLICATIVE
Vite	Peronospora	Intervenire in via preventiva ogni 12-14 giorni fra accrescimento dei germogli e allegagione avvenuta alla dose di 250 g/hl.
Tabacco	Peronospora tabacina	Iniziare i trattamenti al termine della fase di post-trapianto ogni 10 giorni alla dose di 300 g/hl. E' possibile trattare anche prima del trapianto (1-2 giorni prima della messa a dimora) al fine di garantire la massima protezione in fase di trapianto.
Pomodoro	Phytophthora infestans	Iniziare i trattamenti dalla fase di post-trapianto alla dose di 250 g/hl. Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura.

**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite e tabacco, su pomodoro interrompere i trattamenti prima della fioritura.

La consultazione della scheda non sostituisce una attenta lettura dell'etichetta del prodotto.



Peronospora della Vite



Peronospora del Pomodoro