

Medeiro 80 WG Advance

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili
a base di Fosetyl Alluminio

Composizione: Fosetil alluminio 80%
Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)
Classificazione DPD: Non classificato (Nc)
Classificazione CLP: Esente da classificazione
Registrazione: n° 15363 del 15/03/2012
Packaging: sacco 1 kg - cartone 10x1 kg - pallet 400 Kg
sacco 10 kg - pallet 500 Kg



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistemica acropeta e basipeta in grado di garantire una protezione sia della vegetazione esistente che di quella in via di formazione
- Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle difese naturali della pianta con la produzione di Fitoalessine, sostanze in grado di potenziare la capacità di reazione contro le malattie fungine.
- Particolarmente efficace nei confronti dei Ficomietti, Peronospore e Fitofteore (marciumi radicali). Importante effetto collaterale su batteriosi delle frutticole.

VANTAGGI

- Partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia con numerosi principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
- Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta
- Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri
- Particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione specifico in chiave di strategia antiresistenza.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSI E MODALITA' APPLICATIVE
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo)	Fitoftora	Irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Primo trattamento in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.
Vite per uva da vino	Peronospora	Effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.
Pomacee	Fitoftora	Effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su agrumi e pomacee, 28 giorni per uva da vino.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici.
- Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori
- Eventuali miscele con prodotti in sospensione concentrata potrebbero determinare fenomeni di precipitazione, per cui è raccomandato evitare combinazioni complesse con tali tipologie di prodotti.

La consultazione della scheda non sostituisce una attenta lettura dell'etichetta del prodotto.



Peronospora della Vite



Peronospora della Vite