

Tasis

Fungicida antioidico sistemico

Composizione: Miclobutanil 4,5% (=47,2 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Classificazione DPD: Esente da classificazione (Nc)

Classificazione CLP: -

Registrazione: n° 13087 del 04/01/2006

Packaging: flacone 1 L - cartone 12x1 L - pallet 600 L



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fungicida sistemico che esplica un'attività preventiva, curativa ed eradicante.
- Penetra rapidamente nei tessuti vegetali e viene traslocato soprattutto in senso acropeto
- Grazie alla sua rapidità di penetrazione nelle piante, non comporta rischi di essere dilavato dalle piogge

VANTAGGI

- Compatibile con i più comuni fungicidi (compresi gli antiperonosporici sistemici) e i più comuni insetticidi
- Non ha influenza sui processi di fermentazione e sulle caratteristiche organolettiche del vino.



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITA'	DOSI E MODALITA' APPLICATIVE
Vite da vino e da tavola	Oidio, Black rot	Interventi preventivi alla dose di 70-90 ml/hl ad intervalli di 12-14 giorni. In caso di Black rot applicare alla dose massima.
Melo, Pero	Ticchiolatura, Oidio	Iniziare i trattamenti alla fase delle orecchiette di topo alla dose di 110-140 ml/ha e proseguirli a cadenza di 7-10 giorni. Si consiglia miscela con prodotti di contatto.
Pesco, Albicocco	Oidio, Monilia	Contro oidio intervenire alla scamicatura del frutto ad intervalli di 10-14 giorni alla dose di 140-160 ml/hl. Contro Monilia applicare alla dose di 160 ml/hl.
Melone, Cocomero, Zucchini, Cetriolo Pomodoro, Peperone	Oidio	Applicare in via preventiva in presenza delle condizioni predisponenti la malattia o in presenza dei primissimi sintomi alla dose di 140-160 ml/ha ogni 8-12 giorni. Intervalli ridotti e dosaggi massimi in caso di forte pressione della malattia.
Fragola		Intervenire sia in post-trapianto che in produzione alla dose di 110 ml/hl ogni 10-14 giorni in presenza dei primissimi sintomi.
Rosa	Oidio, Ticchiolatura	Intervenire alla dose di 90-110 ml/hl ogni 8-12 giorni in presenza dei primissimi sintomi della malattia.
Garofano	Ruggine	

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima su vite, melo, pero, pesco e albicocco, 7 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchini, cetriolo, pomodoro, peperone, fragola.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Su floreali, data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.



Oidio della Vite



Oidio delle Cucurbitacee